
FICHA TÉCNICA
INSECTICIDAS

VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Elimiplan®

ELIMIPLAN® (Acetamiprid)
RSCO-INAC-0101U-X0243-034-40.0
Formulación: Gránulos dispersables
Fórmula Estructural:



Información general:

Piridilmetilamina. Cloronicotinilo. Neonicotinoide sistémico con actividad insecticida por contacto e ingestión y acción traslaminar, eficaz contra Isópteros, Homópteros, Tisanópteros, Lepidópteros, incluso polillas de los frutales, y Coleópteros. Posee actividad larvicida y ovicida. Los insectos tratados muestran inmediatamente síntomas de envenenamiento con excitación y parálisis. Actúa como agonístico sobre el receptor acetilcolina nicotínico del sistema central, primero estimulando las membranas postsinápticas y después paralizando la conducción nerviosa.

Se degrada rápidamente en suelos aerobios con una vida media de <1 día a 8.2 días. Su fotodegradación no es importante en los suelos. La movilidad en el suelos tanto del i.a. como sus productos de degradación oscila entre moderada y altamente móvil. No se bioacumula en peces y sedimentos. Se considera moderadamente persistente.

No. CAS: 135410-20-7

Composición porcentual:

Acetamiprid:	
(*E*)-*N1*-[(6-cloro-3-piridil) metil]-*N2*-ciano-*N1*-metilacetamidina (Equivalente a 400 g de I.A./Kg)	40.00%
Dispersante, humectante, diluyentes y antiespumante.	60.00%

Campo de actividad:

Entre las numerosas especies que controla destacan: (*Chrysomela*), gusano importado de la col (*Pieris rapae*), mosquita blanca (*Trialeurodes vaporariorum*), mosquita blanca (*Bemisia tabaci*), mosquita blanca del jitomate (*Bemisia argentifolii*), palomilla dorso de diamante (*Plutella xylostella*), piojo harinoso de los cítricos (*Planococcus citri*), pulgón de la col o pulgón harinoso de las cruciferas (*Brevicoryne brassicae*), pulgón del

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

algodonero o mielecilla (*Aphis gossypii*), pulgón del chile (*Aulacorthum [Aphis] solani*), pulgón del tabaco (*Myzus nicotianae*), pulgón myzus (*Myzus persicae*), pulgón negro de los cítricos (*Toxoptera aurantii*), pulgón verde del manzano (*Aphis pomi*) y trips occidental de las flores (*Frankliniella occidentalis*), etc. en cultivos y plantaciones de algodón, berenjena, brócoli, chile, col, col de bruselas, coliflor, gerbera, jitomate, papa, tabaco, tomate de cáscara.

Propiedades de ELIMIPLAN®:
Apariencia: Gránulo de color café claro.
Densidad aparente: 0.60 a 0.70 g/mL
pH en solución al 1%: 5.5 a 7.5
Espuma persistente: Máximo 20 mL.
Solubilidad en agua: 2950 mg/L a 20°C (I.A. IUPAC)
Punto de fusión: 98.9°C (I.A. IUPAC)

Cultivos	Plagas	Dosis g/ha	Intervalo de seguridad	Observaciones
Berenjena Chile Jitomate Papa Pimiento morrón Tomate verde	**Paratrioza o Pulgón saltador** *Bactericera cockerelli* **Mosca blanca** *Bemisia tabaci*	100 – 250	7	Realizar dos aplicaciones a intervalos de 7 días, iniciando al momento de detectar los primeros individuos.
Cidro Lima Limón Mandarino Naranjo Pomelo Tangerino Toronjo	**Psilido asiático** *Diaphorina citri* **Piojo harinoso** *Planococcus citri*	150 – 250 g/1000 L de agua	14	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciando al detectar los primeros individuos de la plaga en el cultivo.

FICHA TÉCNICA
INSECTICIDAS

VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis g/ha	Intervalo de seguridad	Observaciones
Calabacita Calabaza Chayote Melón Pepino Sandía	**Mosquita blanca** *Bemisia tabaci* **Trips** *Frankliniella occidentalis*	150 – 250	7	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.
Arándano Frambuesa Fresa Grosella Vid Zarzamora	**Mosquita blanca** *Bemisia tabaci* **Trips** *Thrips tabaci*	150 – 250	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días iniciando al detectar los primeros individuos de la plaga en el cultivo.
Aguacate	**Trips** *Scirtothrips perseae*	0.20-0.30 kg/2000L de agua*/ha	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. *Se recomienda agregar a la mezcla de tanque el coadyuvante CITÄN a dosis recomendada en su etiqueta.
Aguacate	**Mosca blanca** *Paraleyrodes perseae*	0.20-0.30 kg/ 2000L de agua / ha	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
Aguacate	**Periquito del aguacate** *Metcalfiella monogramma*	0.20-0.30 kg/ 2000L de agua / ha	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
Aguacate	**Chicharrita** *Idona minuenda*	0.20-0.30 kg/ 2000L de agua / ha	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.

FICHA TÉCNICA
INSECTICIDAS

VERSA®

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis g/ha	Intervalo de seguridad	Observaciones
Aguacate	**Trips** *Frankliniella occidentalis*	0.20-0.30 kg/2000L de agua*/ha	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga. *Se recomienda agregar a la mezcla de tanque el coadyuvante CITÄN a dosis recomendada en su etiqueta.
Aguacate	**Mosca blanca** *Bemisia tabaci*	0.20-0.30 kg/2000L de agua/ha	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 15 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
Brócoli Col, Coliflor Col de Bruselas Mostaza Colza Colinabo	**Pulgón cenizo de la col** *Brevicoryne brassicae*	0.15-0.25 kg/ha	7	Realizar 2 aplicaciones foliares enfocadas en el envés de las hojas y los cogollos del cultivo a intervalo de 7 días, iniciar al detectar la presencia de los primeros individuos de la plaga.
Brócoli Col, Coliflor Col de Bruselas Mostaza Colza Colinabo	**Trips** *Frankliniella occidentalis*	0.15-0.25 kg/ha	7	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar al detectar la presencia de los primeros individuos de la plaga.
Cebolla Cebollín Ajo Espárrago Poro	**Trips** *Frankliniella occidentalis*	0.15-0.25 kg/ha*	7	Realizar 2 aplicaciones foliares enfocadas en las axilas y cogollos del cultivo a intervalo de 7 días, iniciar al detectar los primeros individuos de la plaga. *Se recomienda agregar a la mezcla de tanque el coadyuvante CITÁN a dosis recomendada en su etiqueta.

FICHA TÉCNICA
INSECTICIDAS

AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivos	Plagas	Dosis g/ha	Intervalo de seguridad	Observaciones
Sorgo Maíz	**Pulgón amarillo** *Melanaphis sacchari*	0.10-0.25 kg/ha*	1	Realizar 2 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar al detectar los primeros individuos de la plaga. *Se recomienda agregar a la mezcla de tanque el coadyuvante CITÁN a dosis recomendada en su etiqueta.

*Tiempo de reentrada a las zonas tratadas: 12 horas después de la aplicación.

Métodos para preparar y aplicar el producto:
Antes de abrir el producto deberá colocarse su equipo de protección: gorra, mascarilla para vapores orgánicos y polvos, overol, botas y guantes de neopreno y lentes de seguridad. Abra con cuidado el empaque con la ayuda de unas tijeras, pese con la ayuda de una báscula o con algún utensilio graduado específico para este uso, vierta la cantidad indicada de **ELIMIPLAN®** en un recipiente conteniendo la mitad de su capacidad de agua limpia, agite y posteriormente agregue al tanque de aplicación o mochila de aspersión y agite nuevamente.

Toxicología:
Categoría toxicológica: 4 – Precaución – Nocivo si se inhala

Presentaciones disponibles:
Bolsas de 100 g y 500 g.

Fecha de actualización: Febrero 2025