



VERSA®

FICHA TÉCNICA BIORRACIONAL



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Tornasol®

Identificación del producto:

Nombre comercial:
Agente de biocontrol:
Clase:
Formulación:
Concentración:
Equivalente:
Reg. OMRI:
Registro COFEPRIS No.:

TORNASOL®

Extracto de piretrinas
Insecticida
Suspensión concentrada
1.06%
10 g de I.A./L
aqv- 19210
RSCO-INAC-0185-X0589-064-1.06



Insecticida botánico a base de extracto de piretrinas (*Chrysanthemum cinerariaefolium*) que actúa por contacto e ingestión.

Propiedades fisicoquímicas:

Apariencia: Líquido color ámbar ligeramente turbio libre de impurezas visibles.
Clasificación: Insecticida botánico
pH: 5.0–6.5

Mecanismo de acción:

Las piretrinas actúan sobre las células nerviosas de los insectos produciendo una hiperexcitación que provoca la muerte del insecto debido a la pérdida de la coordinación motora y parálisis.

Sin embargo, estas son consideradas como plaguicidas de baja toxicidad a partir de un punto de vista de la salud humana.

Hasta un 20-25% del extracto seco de estas flores está formado por piretrinas, cuyos constituyentes se clasifican en dos grupos:

Piretrinas I (C_nH₂₈O₃)

Piretrinas II (C_nH₂₈O₅), donde n puede ser 20, 21 ó 22.



VERSA®

FICHA TÉCNICA BIORRACIONAL



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Recomendación de uso:

Cultivo	Plaga	Dosis L/200 L de agua	*Intervalo de seguridad	OBSERVACIONES
Aguacate	Trips <i>Scirtothrips perseae</i>	0.5–1.5	Sin límite	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando exista 10% de floración en los árboles
Brócoli Col Col de Bruselas Coliflor Colinabo Colza Mostaza	Pulgón verde <i>Myzus persicae</i>	1.0–2.0	Sin límite	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
Berenjena Chile Jitomate Okra Papa Pimiento morrón Tomate verde	Mosca blanca <i>Bemisia tabaci</i>	1.0–2.0	Sin límite	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se presenten los primeros individuos de la plaga.
Acelga Apio Espinaca Lechuga	Pulgón verde <i>Myzus persicae</i>	1.0–2.0	Sin límite	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, iniciar cuando se detecten los primeros individuos de la plaga.



VERSA®

FICHA TÉCNICA BIORRACIONAL



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.
Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170
Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160
Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila
Tel. 01 (871) 705 40 00

Cultivo	Plaga	Dosis L/200 L de agua	*Intervalo de seguridad	OBSERVACIONES
Arándano	Araña roja <i>Tetranychus urticae</i>	0.5–2.5	Sin limite	Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalo de 7 días, al observar los primeros adultos de la plaga.
Frambuesa	Trips <i>Frankliniella occidentalis</i>			
Fresa				
Grosella				
Kiwi				
Vid	Mosca del vinagre de alas manchadas <i>Drosophila suzukii</i>	0.5–1.5		Realizar 3 aplicaciones foliares a intervalos de 7 días, al observar los primeros adultos de la plaga.
Zarzamora				

*()= Intervalo de seguridad: días entre la última aplicación y la cosecha. SL= Sin Límite

TIEMPO DE REENTRADA A LAS ZONAS TRATADAS: PUEDE REENTRARSE AL CULTIVO UNA VEZ QUE LA ASPERSIÓN HA SECADO.

Métodos para preparar y aplicar el producto:

Antes de abrir el producto deberá colocarse el equipo de protección personal mencionado en el apartado de "PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO" de la etiqueta. Verifique que el envase se encuentra en buen estado. Los productos en recipientes sellados pueden desarrollar presión, ábralos con cautela. Agítelo antes de usar y proceda a abrirlo por la parte superior evitando salpicaduras y el contacto con la piel y ojos. Calibre el equipo de aplicación, en un recipiente aparte colocar una pequeña cantidad de agua, agregar el producto a la dosis recomendada en esta etiqueta y agitar, posteriormente vaciar esta premezcla al tanque del equipo y agregar la totalidad del agua calculada en la calibración. Mezcle las dosis de **TORNASOL®** en la cantidad necesaria de agua limpia para cubrir una hectárea. La aplicación debe ser dirigida y evitar que se desvíe la aspersión por arrastre de viento u otras causas. Asegúrese del perfecto cubrimiento del cultivo. Usar el volumen de agua adecuado por hectárea, acorde al tamaño y/o desarrollo del cultivo.



VERSA®

FICHA TÉCNICA BIORRACIONAL



AGROQUÍMICOS VERSA S.A. DE C.V.

Oficinas / Ventas: Alfonso Gómez Torres #170

Planta Formuladora: Alfonso Gómez Torres #160

Ciudad Industrial CP 27019 Torreón, Coahuila

Tel. 01 (871) 705 40 00

Contraindicaciones:

No aplicar en horas de calor intenso; cuando exista una alta probabilidad de lluvia, o cuando la velocidad del viento sea alta.

Fitotoxidad:

TORNASOL® no es fitotóxico en los cultivos aquí indicados, si es aplicado de acuerdo con las recomendaciones de esta etiqueta.

Presentaciones disponibles:

Envase de 1 L

Fecha de actualización: Noviembre 2023

